



Callithrichiden

Futternummer: 3450

Geeignet für: Callithrichiden und andere Neuweltaffen

IHRE VORTEILE

- ◇ Ein ausgewogenes Futter für Haltung und Zucht angepasst an die Bedürfnisse der Callithrichiden und anderer Neuweltaffen
- ◇ Kleine Pellets für problemlose Aufnahme durch die kleinen Primaten-Arten
- ◇ Vitamin D3 Supplementation an den höheren Bedarf der Callithrichiden angepasst
- ◇ Mit moderatem Eisengehalt für empfindliche Arten (regelmässige Eisenanalysen zur Qualitätsüberwachung)
- ◇ Prebiotische Inhaltsstoffe (kurzkettige Fructo-Oligosaccharide): 0.25%
- ◇ Enthält Taurin (0.09%)
- ◇ Enthält Johannisbrot (1.9%)
- ◇ ohne glutenhaltige Getreide hergestellt

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen einen individuellen Fütterungsvorschlag



FUTTERART, FORM, LIEFERMENGEN

- ◇ Ergänzungsfuttermittel
- ◇ Form: Pellet 4-5mm
- ◇ Liefermengen: 15 kg Papiersäcke
Paletten à 600 kg
- ◇ Produktnummer: 3450.PS.S15

Futterabbildung im Originalmassstab
Farben können vom Produkt abweichen



Callithrichiden

Futternummer: 3450

FUTTERANGABEN

Hauptnährstoffe (%)

Trockensubstanz	90
Rohprotein	24.5
Rohfett	8
Rohfaser	4.6
Rohasche	8
NfE	44.9
NDF	9.5
ADF	5.8
Stärke	24
Zucker	6.6

Energie (MJ/kg)

GE	17.8
ME	13

Mengenelemente (%)

Calcium	1
Phosphor	0.8
Magnesium	0.25
Natrium	0.25
Kalium	0.8
Chlor	0.3

Spurenelemente (mg/kg)

Eisen	250
Zink	106
Kupfer	19
Jod	1.6
Mangan	61
Selen	0.6
Kobalt	0.27

Aminosäuren (%)

Arginin	1.5
Lysin	1.5
Methionin	0.56
Methionin + Cystin	0.92
Tryptophan	0.3
Threonin	1.0

Vitamine (zugesetzt, mg/kg)

Vitamin A (IU/KG)	27000
Vitamin D3 (IU/KG)	9000
Vitamin E	220
Vitamin K3	12
Vitamin B1	21
Vitamin B2	22
Vitamin B6	27
Vitamin B12	0.2
Nicotinsäure	113
Pantothensäure	83
Folsäure	25
Biotin	0.7
Cholin	1577
Vitamin C	890

Zusammensetzung

Mais (NGVO), Kartoffeleiweiss, Sojaextraktionsschrot (NGVO), Geflügelfleischmehl, Sojaöl (NGVO), Hefen, Leinkuchen, Luzernemehl, Apfeltrester, Saccharose, Sonnenblumenkuchen, Reis, Johannisbrot, Maltodextrin, Mineralstoff- und Vitaminmischungen, Fructo-Oligosaccharide, Aminosäuren

Bemerkungen

- ◇ Angegebene Gehalte sind berechnete Mittelwerte bezogen auf luftgetrocknete Substanz.
- ◇ Energiegehalte berechnet nach Angaben aus Kamphues et al. 2014. GE=Bruttoenergie, ME=umsetzbare Energie berechnet nach modifizierten Atwater Faktoren (3.5/8.5/3.5)
- ◇ Spurenelemente: berechneter Totalgehalt. Vitamindeklaration: vor Produktion zugegebene Vitamine. Geschätzte Gesamtvitamingehalte für Rationsberechnungen auf Anfrage.
- ◇ Die Nährstoffgehalte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe und deren Herstellungsprozesse.

UNSERE FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG

- ◇ Durchschnittlicher Futterbedarf pro Tag: ca. 5% des Körpergewichts (als Trockensubstanz). Davon ca. 65% als Pellets anbieten
- ◇ Es empfiehlt sich, die erforderliche Tagesmenge in mindestens 2 Mahlzeiten anzubieten. Als weiterer Bestandteil der Ration ist die Zugabe von Gummi Arabicum, Gemüse und Insekten empfohlen. Vorzugsweise nach der 2. Mahlzeit
- ◇ Wasser immer frei zur Verfügung stellen.

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen einen individuellen Fütterungsvorschlag für die betreffende Tierart

Quellen:

Crissey, S.D. et al. (2003). Nutrition Advisory Group Handbook. Fact Sheet 013, Callithrichids: Nutrition and Dietary Husbandry.
Kamphues et al. (eds), Supplemente zur Tierernährung für Studium und Praxis, 12. Auflage, 2014. M&H. Schaper, Hannover, pp 20-26, pp 20-26
National Research Council (2003). Nutrient Requirements of Nonhuman Primates. Second revised edition, The National Academies Press, Washington D.C., USA