



Insectivores: oiseaux élevage miettes

Numéro d'aliment : 3763

Convient aux : Oiseaux et reptiles insectivores et omnivores

VOS AVANTAGES

- ◇ Aliment complémentaire pour oiseaux et reptiles insectivores et omnivores
- ◇ Pendant la phase de ponte, l'aliment pour oiseaux peut également être proposé comme aliment complet.
- ◇ Teneur élevée de protéines d'insectes (24.5%)
- ◇ Farine de carapaces de crevettes comme source naturelle de chitine (3%)
- ◇ Farine de poisson (7.6%) et produits à base de graines de lin (6%) comme source naturelle d'acides gras oméga-3
- ◇ Avec différents caroténoïdes (32 mg/kg)
- ◇ Un rapport calcium-phosphore élevée (3:1) et donc adapté d'une part à la phase de ponte,
- ◇ d'autre part pour compenser les composants de la ration pauvres en calcium (p. ex. insectes non supplémentés, viande hachée)
- ◇ Avec de la phytase pour une meilleure utilisation du phosphore (750 FTU/kg)
- ◇ Si la ration contient au moins 50% de matière sèche, l'aliment complète les minéraux,
- ◇ Les oligo-éléments et les vitamines de manière idéale, de sorte qu'aucun autre supplément ne devrait être nécessaire.
- ◇ Sous forme de miettes pratique pour l'alimentation sèche ou humide selon l'espèce et l'acceptation

TYPE D'ALIMENT, STRUCTURE, CONDITIONNEMENT



- ◇ Aliment complémentaire
- ◇ Structure : Miettes
- ◇ Conditionnement : Sac en plastic de 12.5 kg
Palette de 600 kg
- ◇ Numéro de produit : 3763.G6.F12
- ◇ Stockage: Au sec (<75% d'humidité), à l'abri de la lumière et au frais (10-25°C). Les variations de température >10°C doivent être évitées. Toujours enlever le film plastique autour des palettes.



Insectivore oiseaux élevage miettes

Numéro d'aliment : 3763

DONNÉES NUTRITIONNELLES

Nutriment principaux (%)

Matière sèche	91
Protéine brute	30
Graisse brute	9
Cellulose brute	8.7
Cendres brutes	12.4
ENA	30.9
NDF	18.4
ADF	9.1
Amidon	16
Sucre	2.4

Energie (MJ/kg)

EB	17.9
EM chien	10.7

Macro-éléments (%)

Calcium	2.9
Phosphore	0.9
Magnésium	0.3
Sodium	0.35
Potassium	0.85
Chlore	0.6

Oligo-éléments (mg/kg)

Fer	350
Zinc	96
Cuivre	18
Iode	1.8
Manganèse	105
Sélénium	0.4
Cobalt	1.1

Vitamines (ajoutées, mg/kg)

Vitamine A (IU/KG)	10'000
Vitamine D3 (IU/KG)	3'000
Vitamine E	600
Vitamine K3	12
Vitamine B1	38
Vitamine B2	27
Vitamine B6	22
Vitamine B12	0.14
Acide nicotinique	110
Acide pantothénique	80
Acide folique	4
Biotine	0.7
Choline	1'800
Vitamine C	400

Acides aminés (%)

Arginine	1.6
Lysine	1.5
Méthionine	1.0
Méthionine + Cystine	1.4
Tryptophane	0.4
Thréonine	1.4

Composition

Farine de protéines d'insectes, maïs, tourteau d'extraction de colza, farine de poisson, tourteau de tournesol, carbonate de calcium, blé, son de blé, tourteau de lin, orge, marc de pomme, farine de carapaces de crevettes, huile de poisson, minéraux, prémélange d'oligo-éléments et de vitamines, acides aminés, caroténoïdes, antioxydants naturels

Remarques

- ♦ Ces teneurs spécifiques sont des valeurs moyennes calculées sur la base de la matière sèche.
- ♦ Energie brute et énergie métabolisable calculées selon les données de Kamphues et al. 2014. EB= énergie brut, EM= énergie métabolisable
- ♦ Oligo-éléments: contenu total calculé. Déclaration des vitamines: vitamines ajoutées avant la production. Teneur totale estimée en vitamines pour les calculs de la ration sur demande.
- ♦ Les teneurs en nutriments sont soumises à des variations naturelles dues aux matières premières et leurs processus de production.

NOTRE RECOMMANDATION D'UTILISATION

- ♦ Pour une composition optimale de la ration, les miettes doivent représenter environ 50% de la ration (à base de matière sèche)
- ♦ Selon les espèces, à combiner avec des insectes vivants ou morts, de la viande, des fruits, etc.
- ♦ Si utilisé comme aliment complémentaire : Alimentation recommandé par jour pour les oiseaux : 50-100 g d'aliments / kg de poids corporel métabolique. Alimentation recommandé pour les reptiles : 6 g de nourriture/kg de poids corporel métabolique. (Correspond alors à 1,5x le taux métabolique de base estimé)
- ♦ Pendant la période de ponte, fournissez des sources supplémentaires de calcium.
- ♦ Selon l'acceptation, les miettes peuvent être offerts sèches ou mélangées avec de l'eau à une bouillie ou mélangées avec d'autres composants de ration.
- ♦ L'aliment ne convient pas aux espèces sensibles au fer
- ♦ Fournissez toujours de l'eau fraîche.

Sources :

Kamphues et al. (eds), Supplemente zur Tierernährung für Studium und Praxis, 12. Auflage, 2014, M&H. Schaper, Hannover, pp 20-26, pp 20-26
 National Research Council (1994), Nutrient Requirements of poultry, Ninth revised edition, National Academy Press
 Bernard J. B. et al. (1997) – Feeding captive insectivorous animals: Nutritional aspects of insects as foods, Nutrition Advisory Group Handbook, Factsheet 003
 MSD Veterinary Manual (2020) – Nutrition in Reptiles – Management and Nutrition – Recommended Nutrient Concentrations for Reptiles; © 2020 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA